

sätt, som om den ätit sielfwa örten. *Curculio* war griseus elytris divaricatis, tör hända i slächt med den, som gör Stäckran i *Phelandrio*.⁴

I Wälborne Herr Archiaterens höga ynnest innesluter mig och framhårdar med diup wörndnad

Wälborne Herr Archiaterens

Ödmiukaste tienare

Abr. Argillander.

Helsingfors d. 3 Jun. 1751.

Linn. Soc. Vol. I: 180—181.

¹ I Fl. Su. ed. II p. 233 upptogs denna för florumrådet nya art under namn af *Sisymbrium arenosum*. Att han äfven ansett den tillhöra släktet *Arabis*, synes framgå af ett par i det följande meddelade bref.

² JOHAN BORGSTRÖM, född 1723, docent vid Åbo universitet i matematik, naturalhistoria och ekonomi, sedan vid Borgå gymnasium successive matheseos et logices, eloquentiæ et poëseos samt slutligen theologiæ lector, död 1785.

³ PEHR ADRIAN GADD, född 1727, docens i naturalhistoria och ekonomi, slutligen professor i kemi och tillika plantagedirektör i Finland, död 1797.

⁴ *Curculio paraplecticus* L., hvilken i stjälkarne af *Phelandrium aquaticum* sig utvecklande skalbagge af LINNÉ ansågs förorsaka den hos hästar förekommande svåra sjukdom, som af allmogen benämndes »stäckra».

498.

Wälborne Herr Archiater.

I förtröstan af den gunst Wälborne Herr Archiateren mig ständigt behagat erte, wågar mig åter at innelykt öfwersända några få örter, dem jag denne sistledne sommar haft lyckan at finna här i Finland; utom desse har jag äfwen träffat den nya Elatine, som fants wed Åbo, wed landswägen 1 mihl från Lovisa Stad wed Sarolax gård.

Pulsatilla 448 Fl. S: i Tavastland och Hollola soken.

Orchis 728 F. S: öfwer alt i Nylands skogar.

Cypripedium 735 F. S: i Savolax och Cuopio soken.

Neotia 743 F. S: darsammastäds.

Sonchus Præf. F. S: i Tavastland och Hollola soken wed Westjærwi träsk.

Prenantes F. S: wed Abbor Fors.

Centaurea calycibus ciliatis ciliis reflexis, som jag för detta haft äran att öfwersända, har jag funnit rätt ymnigt så i Nyland som Tavastland, och är denne en ibland de vulgaireste örter här å orten.¹