

lis 2 oppositis minimis linearibus integerrimis, duae lanceolatae ciliatae. Corolla infundibuliformis decidua. Tubus curvus superne crassior. Limbus bilabiatus. Labium superius ovatum latum, inferius quadripartitum laciniis oblongis acutis. Stam. didynamica corollae inserta, 2 fundo tubi brevissima et unum sterile, 2 tubo longiora pistilli longitudine. Antherae breves transversales. Germen ovatum. Stylus filiformis. Stigma subcapitatum. Capsula oblonga monosperma compressa.⁷

5. *Mammea*. Cal Periant. diphyllum foliolis ovatis conniventibus magnis persistentibus corollam involventibus. Coroll. Petala 4 ovata clausa decidua cum staminibus calyce paulo majora. Stam. filamenta filiformia plurima flexa longa sed pistillo breviora, corollam et calycem superantia, cum petalis, quibus adhaerent, decidua. Antherae subrotundae parvae. Pistillum persistens. Germen sub flore obverse ovatum. Stylus longissimus. Stigma acutum. Arbor ramosissimus decumbens ad mare. Ramuli teretes. Folia apice ramulorum adgregata oblonga apice latiora integerrima. Sessilia glabra carnosia apice subcrenata nervis transversis alternis.⁸ In hoc arbore ad litora Javae crescenti Formica minor nigra forte Fn. Sv. abundabat.
6. *Hernandiae* flores masculini triandrii. Arbor maxima procumbens ad litora Javae; sed non semper procumbens. Folia peltata cordata crassa glabra integerrima.

Framhårdar med obeskrifwelig wördnad, under hjärtelig önskan till en behagelig högtid oughörligen Wälborne Hr. Archiaterns

Götheborg d. 12. Dec.
1752.

allraödmjukaste tjänare
Pehr Osbeck.

¹ Blandt Other Items findes en beskrivelse af denne »Heptandrist«. Linné kalder i Sp. Pl. planten for Guettarda speciosa, opkaldt efter forfatteren til Observations sur les Plantes 1-2 (1747), som Osbeck ofte citerer. Planten hører til Rubiaceae.

² Udgive min rejsedagbog.

³ Hermed kan Osbeck mene frø af Osbeckia. Rhexia og Osbeckia hører til samme familie og ligner hinanden på frugten. Osbeck har sikkert kendt Rhexia.

⁴ I rejsedagbogen kaldes planten Columnea? chinensis; spørgsmålstegnet angiver usikkerhed om, hvorvidt den hører til slægten Columnea. Merrill (1916) har vist, at planten hører til slægten Limnophila. (Gesneriaceae).

⁵ Ruellia ringens Sp. Pl.

⁶ Scutellaria indica Sp. Pl.

⁷ Barleria cristata Sp. Pl.

⁸ Mammea asiatica Sp. Pl.