

*Cnicus exiguus*, capite cancellato, semina tomentosa. T. men som limites äro ändock lika säkra, så tycker jag, det är emot naturen, at skilja dem åt. Annars stå desse *Atractylides* närmast i slägt med *Carlina*, och utom *radius calycinus* skiljas de knapt ifrån henne; ty *facies*, *floscull*, *semina* och *pappus* komma aldeles öfverens.

Sedan jag sist hade den äran, at upvakta H. A., har jag igenomgått et vackert Pyrenæiskt Herbarium af ungefär 100 örter, som Doct. BARNADES samlat, hvaruti jag fått många rätt rara för mig. Jag får låf, at upräkna dem som kärstast, at H. A. må befalla mig at nogare besê dem, som H. A. ej förr sett.

1. **RANUNCULUS** *gramineus* foliis linearibus, longissimis, caule erecto, nudo, unifloro.

*Ranunculus alpinus pumilus* gramineo folio, flore albo, Tournef. Inst. 292.

*Pumilus Ranunculus gramineo folio.* Lob. belg. 818. sine Descr.

2. **RANUNCULUS** *parnassifolius* foliis ovatis integerrimis, nervosis, caule erecto, nudo bifloro.

An *Ranunculus montanus graminis parnassi folio.* Herm. Parad. Tournef. Inst. 286? Radices fasciculatæ. Flores albi.

3. **ANTIRRHINUM** molle foliis oppositis, ovatis, obtusis, pubescentibus, corollæ nectario gibbo, obtuso.

*Antirrhinum villosum origani folio.* Tournef. Inst. 162. Sauvages 139. 135.

4. **ANTIRRHINUM** foliis ternis lanceolato-linearibus, Corollæ nectario gibbo, obtusissimo.

An *Antirrhinum luteo flore.* C. Bauh. pin. 211. Tournef. Inst. 168.

Jag tycker, at *Antirrhina* *calycibus* brevissimis, nectario obtuso, hafva större skillnader, än at de alla skola vara varieteter. Jag underställer H. A. omdöme, och önskade få H. A. utslag derom, nämligen om icke et *Genus naturale* kan vara underkastadt samma lagar, som en *ordo naturalis*, at somlige *Genera* äro mera närslågade fins imellan, än andre af samma *ordo*, och således mutatis mutandis et *Genus naturale* kan