

kan sammanfattas af vissa phalangas Specierum, som fins imellan komma närmare öfverens i fructification. Vid desse bägge Antirrhina äro folia utriusque nog distincta. Asarina Lobel. skiljer ej eller så stort i blomman.

5. DRABA *pyrenaica* perennis, foliis pinnatis ternatisque.

Alyssum pyrenaicum perenne minimum, foliis trifidis Tournef. Inst. 217. är en rätt vacker Draba, caule nudo.

6. SISYMBRIUM, foliis ternatis, pinnatisve, foliolis reniformi-orbiculatis.

Sisymbrium pyrenaicum latifolium, purpurascente flore. Tournef. Inst. Är en sot hög vacker ört med stora blad och blommor.

7. FUMARIA *enneaphylla* caule flaccido, foliis triternatis; foliolis ovatis.

Fumaria hispanica saxatilis, foliis amplioribus cordiformibus, semine compresso. Tournef. inst. 422.

Fumaria enneaph. Barr.

8. SENECEO foliis lanceolatis glabris crenulatis, caule unifloro.

Jacobæa pyrenaica persicæ folio. Tournef. inst. 486. Sålunda var speciem; men caulis uniflorus faller mig nästan paradoxt före i detta Genus.

9. SENECEO *abrotanifolius* foliis pinnato-multifidis linearibus, tenuissimis, floribus corymbosis.

Jacobæa foliis ferulaceis, flore minore. Tournef. inst. 486.

10. PETASITES minor, folio subrotundo MINUARTII, som

Han beskrefvit i Acad. medica. Jag såg henne förleden vår blomma i Trågård, är helt liten, knapt öfver fingers hög. Bladen äro njur-lika, helt tunna, och på båda sidor släta och gröna. Blomman är af Petasitidis vulgaris färg, och har radius, som består af så många Blad, som innersta series squamarum calycis. Corollulæ disci copiosæ, hermaphroditæ, radii femineæ ligulatæ, oblongæ, integræ. Thyrsus pauciflorus. Mon det är någordera af de species, som H. A. anført vid Petasites FL. lapp. 303. S. Den beskrefning, som MINUART meddelat mig, är annars god.