

1753. Julii den 2. MADRIT.

Jag kan ej med något annat visa min fögnad, än at vid et så hugueligt tillfälle öfverlemnna til Herr Archiatern, nästa af de nyaste observationer jag gjort, och däribland et rart nytt slagte af örter, som jag ibland gräsen anser för et det besynnerligaste til sin fructification och så mycket jag förstår sit eget Genus. Det är:

LYGEUM spartum herba alterum. *Clus. hist. 2. p. 220.*

Gramen spicatum sparteum, spica sericea ex atriculo proveniente. Tournef. inst. 518, på hvilket jag under mit vistande på landsbygden och mina små resor omkring Aranjuez haft den lyckan at anmärka fructification. Jag har en så mycket större satisfaction at vid detta tillfället få öfverlämna H. A. det, som jag vid min utresa erhöit H. A. speciellaste befallning at undersöka denna växt. Charactern, beskrifningen och en veritabel Figur följa nu särskilt, at om H. A. så tycker, den kunde insättas i Aëta Upsaliensia, hvaraf äfven H. A. tackes inhämta. huru vida jag tagit rätt, at det skal vara et nytt Genus. Det tycks vara medium mellan Calamaria Ord. 13. och Gramen Ord. nat. 14. Til interims har jag nämnt det Lygeum. Frön och blommor följa tillika, at det må fås i Trädgården och nogare undersökas af H. A. Hela växten skal blifva afsänd i nästa samling.

HERNIARIÆ fruticosa viticulis lignosis Fournes. inst. 507. hväs fructification, jag äfven under denna lilla resan fått undersöka, hvilken också faller mig besynnerlig före och jag öfverlemnna til H. A. skön, om det bör vara Herniaria, som skiljer calyce tetraphyllo, foliolis oppositis exterioribus same staminibus 4 från de andra Species, som nästan hafva calycem monophyllum, patentem, 5: partitum. Jag tror nästan, at affinitates Generum proximorum ej tillåta, at de skola stå under et Genus. Anminstone tycks mig at hon kommer Polycnemum närmare, om differentia numeri expliceras igenom proportion; men det är ändock brydligt, at hon utom de fyra stamina fertilia, äfven har fyra sterilia liksom Herniaria numero quinario. Facies externa skiljer nog från Herniaria. Det torde hända, at af denna Ordo Holeraceorum. 53, flere kunde hafva sådana stamina sterilia, då de nogare blefve undersökte.