

länge; ty baccaæ äro solitariæ och stylus nnicus, förutan de öfriga kännetecken af Asparagis, som jag förr nämt. Mediola Fevillei tycks mycket mindre likna den, åtminstone skiljer frukten mera. Jag undrar nog, at Dr. GUALTER WADE i Lissabon ej ännu översändt Figuren, som han läfvade, til H. A., och hvilken var skönt och präktigt aftagen. Igennom Consulen ARVIDSON i Lissabon, kan någon underrättelse fås i fall H. A. skulle skrifva Doct. WADE til derom.

*Cuscutæ numerus naturalis uti Sverige tror jag altför väl vara 4 med 2 pistiller och efter Basellæ proportion 5 och 3, tycks 4 vara naturellast. Herr OSBECK skickade åfven mig en Indianisk Cuscuta eller Cassytha med 3 stamina; men pistillerne vet jag ej. Jag har endast anfördt hurudana blommorne här föreveta, som jag nu i 3 somrar funnit med 5 talet. Hon lärer dock vara samma Species, fast den är mycket finare och har glomerulos florum exakte globosos S. sphæricos.*

*Trifolium retusum album, calycibus reflexis patulis*: som upvuxit i Trädgården och är et nytt species, lärer väl utan tvifvel vara det samma; som H. A. uti Cataloguen på de frön som upvuxit i Trädgården kallat *Trifolium capitulis subrotundis, leguminibus pendulis*, hvilket jag ej annat vet, än at det skal vara det samma, som jag i mina observationer kallat *Trifolium capitulis subrotundis, floribus pendulis pedicellatis, fructu dispermo*. Cat. 1. N:o 570. hvarpå jag hittils ej vetat något synonyman, om ej något kunde finnas ibland Micheli oräkneliga *Trifoliastra*, hos hvilken jag en gång haft liknelse at finna något dylikt.

Annars uti *Trifolio glomerata* finnas *Calycis laciniæ patentissimi & anteriores imbricatae lateraliter supra posteriores*.

H. A. föreflär, om jag ej kunde göra af Malvis calyce exteriore diphylo, som blifvit omnämde uti et mit bref af den 17 eller 28 Augusti 1752 och uti Descr. ep. 39 et nytt Genus efter de äro flere; men jag bekänner min svaghet at häruti kuuna sluta något säkert. Ut i *Malva vulgari* sitta foliola Calycis exterioris liuet nedanför medium calycis interioris eller supra basin på den samma intre calyx anvuxna, hvilket kännetecken om det beständigt observerades uti alla Malvaæ speciebus calyce exteriore 3 phyllo (som jag ej vet) vore artigt nog at skilja *Malva Linn.* från *Malvaceis calyce exteriore diphylo*, hvareftel desse foliola calycina externa icke hafva den ringaste gemenikap med Calyx, utan likna håldre två bracte-