

*Pinna* dorfi 1:ma rad. 14, plicabilibus; 2:da 13 firmis cum pinnulis 9. Peët. 22. Ventr. 6. Ani 16 cum pinnulis 9 och kunde kallas SCOMBER *oblongus, maxilla superiore acuta, dentibus planis lanceolatis.*

En annan Americansk fisk, som Fransöserne kalla *Becune* och Spanjorerne *Picuda*, är nog vorax äfven som Carite, lär vara ej allenast af samma Genus med honom, utan kanske närmare; och som jag ej ännu sett den, kan jag ej nogare differentie gifva på Carite, ty de äro nog like till Figuren, men inbyggarna säga, at den är different och gör sitt eget Species. Se *Labat. Voyage* hvarest *Becune* beskrifves *Tom. 1 pag. 155. part. 1. c. 20* figuren ses i *Tom. 2. p. 483. part. 6. c. 14.*

SCOMBER *fasciis quatuor caruleo-argenteis, aculeis quatuor ante pinnam dorsalem* fick jag i stora Ocean. Han följer också med skepen, och blir ofta rof för Dorado och andra Scombri. *Subscriptus Ducton. S.N. 489.*

*Corpus* oblongum, compressum; prominentia lateralis caudæ adiposa ut in superioribus, sed dorsum monopterygium, pinnulis nullis ad caudam. *Pinna* dorf. rad. 27 cum aculeis quatuor parvis ante pinnam.

Pectoralis 19. Ventr. 6. Ani 17 cum duobus aculeis.

Cauda minus bifurca ac in reliquis, & magis longitudinalis, radiis 19.

PARGO Hisp. Amer. LABRUS *erythrinus totus ruber, cauda subintegra*, är rätt stor, till en och en half alns längd, och lika figure med de andre Turdi; men helt röd och cauda paulo inæqualiter truncata. *Pinna* dorf. rad. 23: primis 10 acutis. *Species Erythrinus. S.N. 469.*

Pector. 17. Ventr. 6. Ani 12. tribus acutis Caudæ 16.

MERO Hisp. Amer. LABRUS *pallide fuscus, margine pinnarum dorsal. pectoraliumque fulvo* är lik den förra; men något mera tjock. *Pinna* Dorf. 1:ma rad. 24: primis duobus acutis. Peët. 17. Ventr. 6. Ani 12: tribus acutis. Caudæ æqualis, truncata rad. 17. Margo Pinnarum dorsal. & pectoral. pulcre fulvus. *Subscript marginalis. S.N. 476.*