

vel glandulosa. ZEA Mays. IATROPHA Manibot. RICINUS communis. VISCUM rubrum. CARICA Papaya. MUSA paradisiaca. HOLCUS saccharatus. CENCHRUS ecbinatus & tribuloides. ATRIPLEX herbacea, foliis oblongis denticulatis, in petiolos attenuatis. COCOS nucifera, jämte åtskilliga andra, som jag ej ännu hunnit lära mig.

Af dessa vil jag endast denne gångent företaga mig och omröra fructificatio HIPPOMANES, aldenstund jag ser den vare så ofullkomligen beskrifven af PLUMIER, at H. A. därpå ej kunnat få Character naturalis. Jag skal våi vidare observera den och affkicka hela beskrifningen. Jag har ännu ej mer än en gång sett den.

* Flores masculi in Amento subulato longo (Spica) erecto, terminali ramis glomeratis: glomerulis brevibus, alternis, spartis, sessilibus. Glomer singulus ex quindecim circiter flocculis constat, omnibus erectis, basi suffultis: Bractea brevissima, latiuscula, leviter acuminata. Glandula una utrinque ad latus singuli glomeri vel bractæ, amento adpressä, orbiculata, disco plano.

CAL. Perianthium monophyllum, turbinatum, apice bifidum; coloratum, minimum, laciniis obtusis parvis.

COR nulla.

STAM. Filamentum unicum, crassiusculum, longitudine calycis. Antheræ binæ, approximatae, singula extrorsum sulco exarata, hinc quatuor Antheræ apparent.

* Flores Feminei solitarii, sessiles ex apicibus ramulorum aliorum, terminales.

CAL. nullus.

COR. nulla.

PIST. Germen globosum, magnum. Stylus nullus. Stigmata 6 vel 7, recurva, rigida.

PER. Drupa globosa, glabra, terminata stigmatibus persistentibus.

SEM. Nux ossea, maxime irregularis, plurimis alis, sulcis & apophyfis mucronata. Nucleus . . .

Tota arbor scatet succo lacteo.

Under mit vistande på Sjöen, hölt jag prælectiones, och skref en liten explication öfver det angelägnaste af Philo-
phia