

P.I.R. *Germen* ovatum, medietate superiori trigono-pyramidatum: angulis subacutis. *Stylus* filiformis, rectus, simplex, calyce paulo minor. *Stigma* capitato-obtusum, simplex, apice levissime emarginato.

P.E.R. *Capsula* ovata, medietate superiori trigona, calyce recta, unilocularis, ad medium trifariam dehiscens.

S.E.M. plurima, oblonga, utrinque acuta, minutissima.

Color *Calycum* incanus, marginibus subalbis; *Germnis* luteo-viridis, *stigmatis & Antherarum* luteus.

Ab Illecebropurpureo (*Loefflingia*) cui proxime accedit, differt corolla nulla; calyce obtusiore ovali, foliolis integris oblongis; ob stylum unicum alias proxima.

LOEFLINGIA.

„ **LOEFLINGIA hispanica** (Illecebrum spurium Lœfl.).

Habitat Madriti in collibus nudis cis Casam del Campo, supra saltum, vulgo foto de Migas calentis, copiose.

Radix tortuosa, descendens, ramosa, glabra, annua.

Caules solitarii vel plures, profusi, procumbentes, sursum papillo adscendentibus articulati, teretes, pilis viscidis tenuissime pubescentes, longitudine semiunciali vel digitali.

Folia opposita, ad genicula inferiora, linearis-acuta, minima, ad basin denticulo utrinque acuto, brevissimo crebro notata; superiora subulato-tridentata: denticulis lateralibus erectis in medio latere folii.

Flores sessiles, axillares in spicis lateralibus alternis, imbricati, conferti.

Bracteæ subulatae, tridentatae, parvae, imbricatae.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, erectum: *foliolis* distictis, lanceolatis, leviter intus inferius concavis, apice tereti subulato acutissimo, pilo quasi terminato, lateralibus similiter ac folio denticulo utrinque subulato, brevissimo notatis, interioribus tribus intus quasi coloratis, foras omnibus subviscosis.

COR. *Petala* quinque (non raro solum quatuor, quantum est possibile videre), minutissima, oblongo-ovato, globosa, conniventia, integerrima.