

*Flores* terminales, culmi ramulis sessiles, aggregati in Capitulum plano-compressum, fastigiatum, truncatum.

*Involucrum* bicornne ex foliis binis, brevissimis, con-  
duplicatis, vagina ampla compressa, foram fasti-  
giopaullo longius.

**CAL.** biglumis, compressus; glumis subæqualibus, altero paullo breviori angustiore; dorso acuto, compresso, muticis, glabris, unifloris.

**COR.** biglumis: glumis calyce latioribus, dorso acutis, compressis, calyce paullo majoribus, muticis.

**STAM.**

**PIST.**

**PER.** corollæ glumæ semen continent, demittunt.

**SEM.** unicum, oblongum, compressum, sulco in altero latere, nudum nec corolla adnata obtectum.

4. **DACTYLIS** *cymosuroides* quæ Phalaroides spicis lineari-  
bus terminalibus secundis adpressis.

*Habitat* in locis palustribus, marinis, argillosis, graminosis  
trans Fluvium Tagum Ulyssiponi Lusitanæ, autumnò  
florens.

*Radix* fibrosa, repens.

*Culmi* erecti, solitarii, pedales circiter, superne foliosi, in-  
ferne nudi, foliis orbati & quasi spongiosi ab vaginis  
persistentibus, imbricatis; frequenter & minute geni-  
culati, glabri.

*Folia* graminea, erecta, involuta, glabra, supra subtili-  
ter striata, quasi subtomentosa. *Vagina* longæ; totum  
Culmum ubique vestientes, geniculis *septo, 6:pto, 10:pto*  
&c. longiores, glabræ, imbricatæ post folia decidua per  
inferiorem culmum.

*Membranula* integra, rigida, brevissima vixque nisi  
margo vaginæ truncatus.

*Flores* spicati, unilaterales, duplici serie alternatim imbric-  
cati, solitarii, sessiles, erecti.

*Spica* ternæ, rarius binæ l. quaternæ, alternæ, ter-  
minales, lineares, acute dorso suo singulo nodo  
sibi invicem approximata, adpressa, unicam spi-  
cam sæpe mentientes.