

III. TRIGYNIA.

HOLOSTEUM.

8. HOLOSTEUM *umbellatum*.

Alfina verna glabra, floribus umbellatis albis. *Tournef. inst.* 242. *Vaill. Paris.* 7. n. 4. *descr. bona* (refert ad *Fig. 2. tab. 3.* quæ proprie est *Alfines vernæ glabræ Mart.* atamen præsentem plantam, primos flores explicantem, sat bene repræsentat.

Habitat Madriti, vulgarissima primo vere.

Radix tenuissima, annua, fibrosa.

Caulis suberectus (vel subprocumbens), semidigitalis usque spithamalis, glaber vel tenuissime pubescens; prope radicem ramulosus: ramulis erectis cauliformibus.

Folia radicalia copiosiora, lanceolata.

Caulina opposita, lanceolata, basi coadunata, glabra; at lateribus sæpe pilis raris tenuissimis, præsertim inferius ciliata.

Flores terminales 4-8 ex eodem loco orti, successive exescentes. *Pedunculi* ab initio brevissimi, demum elongantur, filiformes; post florescentiam semiunciales vel unciales, deflexi.

Bractee umbellæ subjectæ; ovatæ, acutæ, brevissime.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: foliolis lineari-lanceolatis, longiusculis, acutis, concavis, glabris.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, integra, acuta, ad apicem tamen incisura sublaterali, obtusa, obliqua notata vel inæqualiter sæpe tridentata, calyce paulo longiora.

STAM. *Filamenta* tria, subulata, petalis dimidio breviora, basi glandula tumida depresso-re imposita. *Anthere* bipartitæ, didymæ.

PIST. *Germen* oblongum, obtusum. *Styli* tres, erecti, approximati. *Stigmata* crassiuscula, divergentia.

PER. *Capsula* ovato-cylindrica, teretiuscula, recta, calyce longior, summo apice dehiscens denticulis sex, paulo inæqualibus, acutis, revolutis.

SEM.

Color Corollæ albus.