

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

ERICA.

23. *ERICA cinerea* foliis acerosis glabris ternis, corollis oblongo-ovatis flaminibus longioribus verticillato-racemosis.

Habitat in collibus nudis copiosissime per Portugalliam.

Radix . . .

Caules ramosi, vagi, teretes, lignosi, nudi, fruticosi.

Rami confimiles, foliosi.

Folia acerosa f. linearia, angustissima, glabra, compresso-cylindracea, fusco-viridia, subtus linea pallida longitudinali notata, terna, rarius sparsa: verticillis confertis *Pedicellis* brevissimis, levissime decurrentibus, pallidis cuta, patentia. Ex alis foliorum sæpe fasciculus foliosus, novi ramuli initium ordiens.

Flores in racemo verticillato terminali ramorum dispositi, nutantes.

Pedunculi corollæ longitudine, terni in verticillis confertis, recurvi.

Bractea foliis exacte similes.

CAL. tetraphyllus, dimidio corolla brevior: foliolis linearibus, angustis, acutis.

COR. monopetala, oblongo-ovata, apice contracta: *Limbo* quadridentato, dentibus reflexis, acutis.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, corollæ dimidio paulo breviora. *Antheræ* erectæ, acutæ, nigræ, sursum parum bicornes: corniculis acutis: inter cornua longitudinaliter dehiscentes; utroque apice cohærentes.

PIST. *Germen* oblongum, truncato-obtusum. *Stylus* filiformis, corolla paulo longior. *Stigma* obtusum.

PER. . . .

SEM.