

24. *ERICA umbellata*, foliis acerosis glabris ternis; corollis ovatis, staminibus brevioribus, terminalibus.
- Habitat* in Portugallia in collibus *Ericæ* prioris sp. & *Ulicæ* obfistis. Legi etiam Porti ad colles sylvaticos extra urbem austrum versus sat copiose.
- Radix*. . . .
- Caulis* fruticosus, varie ramosus, plerumque inclinatus, glaber.
- Rami* confimiles, tenues: ramulis ternis patulis.
- Folia* acerosa, brevia, terna, glabra, viridia, subtus linea albida notata.
- Flores* in umbella simplici, terminali ex apice ramorum & ramulorum.
- Pedunculi* tenuissimi, ex uno loco oriundi, 4, 5, 7 numero.
- Bractee* omnino nullæ, nec alia folia umbellæ subiecta adfunt.
- CAL.** tetraphyllus, cum aliquot aliis foliis arcte incumbentibus: foliolis linearibus; Corollæ  $\frac{2}{3}$  partem attingentibus.
- COR.** monopetala, ovato-subrotunda, versus apicem contracta, angulata: ore quadridentato, æquali; pallide cærulea, marcescens.
- STAM.** *Filamenta* subulata, corollæ æqualia. *Antheræ* oblongæ, apice bicornes, nigræ, extra corollam prominentes.
- PIST.** *Germen* subrotundo-oblongum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* obtusum, simplex.
- PER.** *Capsula* oblonga, parva, obsolete-angulata, intra corollam marcidam, aridam.
- SEM.** minuta, plurima.
- Priori multo minor, corollis magis pallidis, foliis longe brevioribus.
25. *ERICA ciliaris* foliis ovatis ciliatis ternis, corollis ovatis apice tubulosis irregularibus verticillato-racemosis.
- Habitat* in Portugallia in *Ulicetis*, vepretis, sub rosis, rarius ad Porto.
- Radix* lignosa.

*Caulis*