

Facies fructificationis Sedi vel apprime Penthori.

Differt a Ruta vulgari latifolia, quæ etiam in montibus Ulyssip. crefcit.

α Ruta nostra habet flores sessiles, spicatos, approximatos.

vulgaris - - pedunculatos, raros vix corymbosos.

β. - - nostra - - capsulam magis quadrilobam lobis apice obtuse rotundatis.

vulgaris - - capsulam apice solum quadrifido, acuto.

γ. - - nostra puncta capsulæ magis conspicua.

TRIGYNIA.

ARENARIA.

27. ARENARIA foliis setaceis, floribus pentandris, calycum foliolis subulatis.

An? Alfine tenuifolia *J. Bauh. Tournes. inst. 243. Vaill. 7.*

3. vel? Alfine annua s. minor angustifolia, flore albo *Juss.*

Barr. n. 483. (Barrel. ic. 580) licet illic valde ramosa

& nostra quasi semper simplex.

Habitat in collibus extra portam Toletanam.

Radix annua, simplicissima, descendens, recta, fibrillis paucis lateralibus.

Caulis solitarius, simplex vel ramis 1. 2. ex radice prodeuntibus, teres, erectus, uncialis, tenuissimus.

Folia setaceo-subulata, erecta, adpressa, opposita, caulem totum obtegentia; folia summa basi latiuscula, subulata.

Flores dichotomi, terminales, pauci.

Pedunculus sub & post florescentiam erectus, capillaris.

CAL. Perianthium pentaphyllum: foliolis subulatis, striatis, paucis pilis obtis (non tamen hirsutis), acutissimis, membranula nulla auctis.

COR. Petala quinque, oblonga, calyce paulo minora vel æqualia, integra, acuta.

STAM. Filamenta quinque inter petala, setacea, basi glandulæ infidentia, erecta. *Antheræ* subrotundæ.

PIST.