

COR. monopetala, ringens, reflexa. Tubus calycis tubi longitudine, cylindricus, basi contortus. *Labiura superius* nullum inferius vergit. *Labium inferius* superius vergens, calyce toto longius tripartitum: laciniis lateralibus ad basin labii, oblongi; terminali lacinia obovata, integra, basi denticulis duobus minoribus acutis notata.

STAM. *Filamenta* quatuor, curva, ad labium nullum inclinata, curva ad labium inferius. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* fetaceus, staminum situ & longitudine. *Stigma* . . .

PER. nullum. *Calyx* immutatus femina fovet.

SEM. quatuor, subglobosa, nigra, glabra.

Color Corollæ albescens. *Odor* obsolete gravis, sed odorata nominari non meretur. *Calyx* perfecte similis est Ocymo, sed corolla Teucris: est hinc *Genus* quasi intermedium, distinctum ab aliis Teucris calyce manifeste bilabiato.

Floret in mense Julio & Augusto.

PRUNELLA.

33. **PRUNELLA** *lusitanica* bracteis pinnatim dentatis ciliatis.

Prunella odorata lusitanica, flore violaceo. *Barr. ic.* 561.

Clinopodium lusitanicum spicatum & verticillatum. *Tournef. inst.* 195. *Juss. Barr.* 28. n. 269.

Bugula odorata lusitanica. *Cornut. canad.* 46.

Habitat Madriti rarissime ad margines agrorum, ad Aranjuez copiosius.

Radix simplex, descendens, attenuata fibris lateralibus.

Caulis brachiatus, pedalis circiter & minor, erectus, quadrangulus, pubescens: lateribus planis: Ramis oppositis, erectis, simplicibus, per totum caulem, angustioribus.

Folia lanceolata, subacuta, sessilia, profunde & distinctissime serrata: serraturis angustis, obtusis, æqualibus; glabra.

Flores, in spicis terminalibus oblongis, erecti, solitarii ex alis bractearum, oppositi, subsessiles, *pedicello erecto*, brevissimo,

Bra-