

CAL. *Perianthium* diphyllum, laterale: foliis lanceolatis, acutis, angustis, apice in floribus superioribus bifidis, Corolla paulo minoribus.

COR. tubulata, ringens, curva, tubo inferius tereti, superius dorso carinato. *Limbus* bilabiatus, subæqualis.

Labium superius bifidum: laciniis inflexis, crenulatis, obtusis, brevissimis. *Lab. inferius* trilobum, recto-dependens: laciniis lateralibus tridentato-acuminatis, intermedia subrotunda paulo majore crenulata.

Nectarii squama minima ad basin anteriorem germinis.

STAM. *Filamenta* quatuor, tubo antice affixa, curva, corollæ longitudine, in fauce eminentia. *Antheræ* subcordatæ, distinctæ.

PIST. *Germen* oblongum, acutum. *Stylus* filiformis. *Stigma* capitatum, subquadratum, cum sulco in medio, nutans.

PER. . . .

SEM. minutissima.

Color Corollæ flavo-pallidus, dorso obscure purpurascens, limbo flavo-pallido. *Color Plantæ* fuscus.

Nullum odorem peculiarem offendi.

36. **OROBANCHE** *cernua* caule simplici, corollâ incurva bracteis deltoidibus longiore.

An Orobanche lusitanica, flore atro-purpureo. *Tournef. inst.* 176?

An Orobanche subcæruleo flore sive II. *Clas. Tournef. loc. cit.?*

Habitat ad Aranjuez supra radices *Artemisïæ* campestris erectæ, odore *Carlinæ*; in campis sterilissimis.

Radix tubere oblongo baseos caulis.

Caulis simplicissimus, erectus, teres, spithamalis, glaber.

Folia nulla, sed *Squamæ* oblongæ, vagæ.

Flores in spica, ultra medium *Caulis* occupant, sessiles, rariusculi.

Bracteæ deltoides, acuminatæ, paulo convexæ, corollæ breviores.

CAL.