

CAL. *Perianthium* diphylum, laterale, bractea paulo brevius : foliolis ovatis, acuminatis : inferiorum florum simplicibus, superiorum plerumque bifidis.

COR. monopetala, ringens, tubulosa, calyce duplo longior, arcuatim curva, sinu subtus subrecto quasi infracta. *Tubus* basi ventricosus, teres, sursum compresso-triangularis, dorso carinato. *Limbus* brevissimus, quinquesfidus, bilabiatus, æqualis quasi longitudinis. *Lab. superius* bifidum, compressum : laciniis rectis, obtusis (non inflexis). *Lab. inferius* trilobatum, planum : laciniis transversim oblongis ; lateralibus brevissime acuminatis ; intermedia subcrenulata ; marcescens.

Nectarium Squama subglandulosa, ab anteriore parte basi Germinis, adpressa, transversim oblonga, convexa.

STAM. Filamenta quatuor, subulata, tubo anterius affixa, adscendentia, sursum incurva, extra corollam non prominentia. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* oblongo-acutum. *Stylus* filiformis, sursum incurvus. *Sigma* capitatum, transversale, bilobum, obtusum, nutans.

PER. . . .

SEM. minutissima.

Color corollæ albo-pallidus, dorso tubi ad rosco-pallidum inclinans. Limbi saturatè purpureus s. violaceus.

Differt a priori :

Bracteis deltoidibus corolla minoribus.

Corollæ tubo basi ventricosiore ; superius insigniter incurvo,

- - - laciniis limbi integerrimis.

labii superioris erectis : inferioris æquilibus.

Staminibus & Pistillo non extra florem prominentibus.

Nectarii squama optime conspicua.

Plantæ colore pallido, superficie glabra, nec non colore Floris.