

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

ECHINOPS.

40. ECHINOPS *frigofus*, calycibus capitatis: lateralibus
minoribus: squamis ciliatis, corollæ laciniis linearibus
laxis.

Carduus tomentosus, capitulo minore. *Baub. pin.* 82.

Echinopus tenuifolius violaceus. *Tournef. inst.* 463. *Juss.*
Barr. 1028.

Carduus sphærocephalus tenuifolius violaceus. *Barr. ic.* 144.

Habitat in collibus apricis cis saltum vulgo soto Luzon
Madriti cum Atractylide humili.

Radix simplex, descendens, filiformis, annua ni fallor.

Caulis erectus, simplex, rarius bini ex radice, erecti, digita-
tales usque pedales, tomento adpresso tenui tenaci in-
voluti.

Folia radicalia pinnata: pinnis oppositis, dentato-spinosis.

Caulina inferiora & media pinnatifida: laciniis lanceo-
latis, integris, apice acuto-spinosis; supra pilis rigi-
dis depresso, subtus ex toto tomentosa.

Caulina surama lanceolata dentata, dentibus spinulis a-
cutis armatis.

Flores in capitulum subrotundum, laxiusculum, solitarium,
terminale congesti.

Receptaculo globoso, nudo, hinc inde pilis referto;
floribus lateralibus seu inferioribus minoribus, steri-
libus.

CAL. *communis* omnium calycum nullus, nisi pilii reflexi
ad caulis summum.

Proprius quinquefariam imbricatus, quinquangularis:
squamis subulatis, basi latioribus: infimis ovato-
lance-