

Caulis plures vel solitarii; eretti, adscendentes vel diffusi ratione soli, tenui tomento laxo vestiti; *rami* patuli, saepe dichotomi.

Folia lanceolata, obtusiuscula, inferius attenuata, sessilia (spathulata), alterna, tomentosa.

Flores sessiles, solitarii vel plures ex aliis foliorum & ramorum, in globis rotundis valde tomentosis s. lanatis.

CAL. *inferior* obsoletus, tetraphyllus, patens, laxus: foliolis angustissimis, acutis: foras & lateribus tomentosis, interius glabris. *Interior* maximus, 7-9 phyllus: foliolis situ laxis, distinctis, galeato-compressis: margine exteriore semicirculari; interiore in aciem rectam nudam rima augustissima aperta compresso; foras unidique tomento copiosissimo s. lana tectis.

COR. communis ex masculis 1, 2-5 in centro & femin. 7-9 in ambitu: *masculis* corollula tubulata, minima, quinquedentata absque subiecto Germine. *Feminis* nulla.

STAM. masculis *Filamenta* quinque. *Anthera* cylindrica, apice conica. *Feminis* nulla.

PISR. masc. nullum. *Femin.* *Germen* obovatum, compressum, glabrum, inclusum intra singula foliola calycis interioris. *Stylus* setaceus, media parte superiori bifidus. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Folia calycina interiora* includant semina, decidunt.

SEM. solitaria, compressa, obovata, margine interiore rectiore, vestita foliolis calycinis induratis, lanatis.

REC. filiforme, elevatum, in tubercula columnaria divisum pro flosculis feminis, apice præbens flosculos masculos absque paleis.

MONOGAMIA.

LOBELIA.

46. *LOBELIA urens* caule eretto, foliis lanceolatis subdentatis, spica laxa longa terminali.

Habitat in Portugallia ad latera montium & in subhumidis graminosis.

Radix crassiuscula.