

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

TRIANDRIA.

OSYRIS.

47. OSYRIS *alba* foliis linearibus acutis.

Casa pœtica nonospeliensium, an Theophrasti. *Lob. belg.* 519. f. 2. lc. 433. *Tournef. inst.* 664.

Casa quorundam. *Clus. hisp.* 181. f. 182.

Habitat Ulyssipone in collibus arenosis; Madriti ad viam Pardenferam cis Casa del campo albique.

Radix lignosa, perennis. . . .

Caules frutescentes, perennes, lignosi, teretes, cortice glabro nigricante tecti, valde ramosi, ramis erecti. *Ramuli* novelli alterni, undique pro singulo folio acuto angulati.

Folia linearia, acuta (Lini), foliatio simplicitissima, imbricata, sparsa, erecta, sessilia, integerrima, glabra.

Flores solitarii, subsessiles, terminales, ramulis brevibus lateralibus; pedunculis vix ullis.

Flores *hermaphroditi* in distinctis plantis, semper rariores & solummodo terminales ramulis.

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, trifidum; laciniis lato-ovatis, acutis, plano-patentibus, rigidis.

COR. nulla, nisi margo nectariformis triplex, intus ad divisuras calycis, eique adnatus, obtusissimus, crassiusculus.

STAM. *Filamenta* tria, brevissima, media calycis singulæ laciniæ inter margines corollinas. *Antheræ* subrotundæ, parvæ.