

57. ALLIONIA *violacea*.*Radix* . . .*Caulis* herbaceus, erectus, debilis, ramosus.*Folia* opposita, cordata, acuta, integerima, glabra, inferiora longe petiolata.*Flores* in panicula ramosa, terminales, bracteolis brevibus.*Corolla* majuscula purpureo-cerulea. (Hinc facie reddit a superiori planta, ut & corollæ magnitudine).*CAL*. *Involucrum* commune monophyllum, laxum, quinquefidum: laciniis ovato-acutis, paulo inaequalibus, divisura una usque ad basin sectum, persistens.*Perianthium* proprium nullum.*COR*. aggregata triflora, aequalis, *propria* infundibuliformis f. obconica: ore erecto, quinquefido: laciniis exterioribus paulo longioribus.*STAM*. *Filamenta* quatuor, setacea, corolla longiora, ad unum latus flexa. *Antheræ* subrotundæ.*PIST*. sing. *Germen* sub corollula, oblongum, obfolete octangulum. *Stylus* setaceus, staminibus longior. *Stigma* multifidum, lineare.*PER*. nullum.*SEM*. solitaria, oblonga, quinquangula, tuberculis undique inaequalia, nuda.

A praecedente in primis differt calyce & partim corolla.

Cunamensisibus Jasminullo.