

59. CEDRELA. *Brownii*. Cedro *Authoris*.

Arbor magna, excelsa, trunco interdum quatuor l. quinque pedum diametro, glabriusculo, subæquali, superne pulcro, æqualiter ramosa: ramis in corna oblonga spartis.

Folia alterna, pinnata, bi-vel tripedalia; *foliis* oblongo-acutis, glabris, integerrimis: mucrone angusto.

Pedunculis teres; superne leviter compressus, basi clavatus; pedicellis teretibus oppositis.

Flores in Racemo ramosissimo, paniculato, ramis patetissimis: ramulis alternis, remotiusculis, bi-vel trifloris.

Corolla albescens, carnea, liliacea, facie fere Hyacinthi.

CAL. *Perianthium* monophyllum, breve, convexum, glabrum, trifidum: *laciniis* ovatis; marcescens.

COR. pentapetala, tubulata, basi ventricosa, sursum contractior; ore patulo; calyce multo longior. *Petalis* linear-oblongis, obtusis, erectis, ad tertiam partem bases interius receptaculo pentagono adnatis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, corolla dimidio breviora, receptaculo adnata. *Antheræ* oblongæ apice extrorsum flexo.

PIST. *Germen* receptaculo quinquangulati ad altitud. corollæ mediam elevatum; globosum. *Stylus* filiformis, crassiusculus, corollæ longitudine. *Stigma* capitatum, depressum.

PER. *Fructus* quinquelocularis.

SEM. . . .

Hispanis Cedro.

Habitat CUMANÆ hinc inde fere culta. In Insula TRINITATIS ad ostia fluvii Orinocentis copiose.

Arbor hæc naturali affinitate jungitur cum Chryso-balano, Spondia, de quibus infra.

60. CALCEOLARIA. (*Viola forte*).

1. CALCEOLARIA caule brachiato glabro, floribus racemosis.

M 4.

Radix