

DIDYNAMIA.

MONOGYNIA.

68. BONTIA. (Donatia *Læfl.*)

Arbor mediocris vel frutex, ramis oppositis, teretibus, glabris.

Folia opposita, lanceolata, crassa, rigida, integerrima, glabra, acuminata, triuncialia, supra viridia, infra glauco-incana, subsessilia.

Flores in spicis oblongis & subrotundis, quadrangulatis, compactis; sessiles, oppositi.

Bractæola tres ad singulum florem: unica exteriore; duabus lateralibus ovato acutis, carinatis, brevibus.

Corolla alba.

Fructus viridis, amygdalis major: Cotyledonibus junctis, duplicatis intra tunicam exteriorem.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, inæquale: *foliis* oblongis, dorsali unico persistente.

COR. monopetala, inæqualis. *Tubus* subrotundus, calycis longitudine. *Limbus* quadripartitus, bilabialis: *labium sup.* indivisum, obtusum, emarginatum: *lab. inf.* tripartitum: laciniis oblongis; lab. superiore duplo longius.

STAM. *Filamenta* quatuor, setacea; quorum anteriora longiora, dorso corollæ adpressa, parallela, apice lateraliter patentia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* oblongo-fusulatum, desinens in *Stylum* fusulatum; longitudine staminum. *Stigmata* duo, acuta, erecta.

PER. nullum.

SEM. unicum, nudum, magnum, ovatum, compressum, apice paulo obliquo, acuto: cotyledonibus junctim duplicatis.

Hispanis MANGLE negro.

Habitas ad mare.