

Spina oppositæ ex alis, patentissimæ, subulatæ, foliorum mediæ longitudinis vel quartæ partis; in ramis sterilibus magnæ; in fructificantibus vero minimæ aut omnino nullæ.

Flores in racemis lateralibus, oppositis vel terminalibus, pendulis, plurimis, pedicellis brevibus post florescenciam elongatis, fructus longitudine.

Bractææ lineares, subulatæ, angustissimæ.

Corolla purpurascens.

Baccæ luteo-rubræ.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, cylindricum; superne quinquangulare: ore integro, quinquedentato: denticulis acutis.

COR. tubulata; *Tubus* cylindricus: superne paulo latior, parum incurvus, planiusculus, quinquepartitus: *laciniis* oblongis; subæqualibus.

STAM.

PIST. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, rectus, staminibus brevior. *Stigma* simplex, obtusum, crassiusculum.

PER. *Bacca* globosa, calyce superne connivente arcte tecta, unilocularis.

SEM. quatuor, subrotunda, ovata, hinc convexa, inde angulata.

Hispanis FRUTA de POLAMITA.

Habitat in silvis depressis circa CUMANA.

71. KRAMERIA. (Ixine *Læfl.*)

Radices fibrosæ.

Caules fruticantes, inferne procumbentes, undique sparsi; mox ascendentes, virgati; inferius subdivisi; superius ramulis vagis erectis.

Folia alterna, lanceolata, superiora linearia, acuta, subsessilia.

Flores alterni in racemo terminati; pedunculis axillaribus, in medio instructi bractæolis duabus acutis linearibus.