

Folia alterna, oblonga, biuncialia, acuta, glabra, vix sensibilibiter crenata, venosa; petiolis femuncialibus.

Flores in racemis digitalibus, lateralibus; pedicellis sparsis, absque bracteis; albi.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, patentissimum, reflexum: *foliolis* oblongis, concavis, coloratis, persistentibus, sub interioribus squama utrinque una minutissima, subulata.

COR. nulla, nisi calycem velis.

STAM. *Filamenta* octo ad duodecim, capillaria, corolla paulo breviora, erecta. *Anthera* oblongæ, compressæ, basi bifidæ.

PIST. *Germen* oblongum, compressum. *Stylus* vix ul-
lus. *Stigma* crassiusculum, multifido-lacerum.

PER. *Bacca* oblonga, paulo compressa, calyce reflexo in-
fidens, glabra.

SEM. unicum, oblongum, compressum, glabrum.

A. Rivina humeli diversa staminum numero. *Bacca* matura nigra est, figura rotundior, rugosior & Se-
mina angulosa.

Habitat in depressis pascuis juxta CUMANA.

82. TRIBULUS maximus.

Radix annua, fibrosa.

Caules diffusi, longi, articulati; ramis alternis procumben-
tibus.

Folia opposita, pinnata: foliolis trijugatis cum impare, el-
liptico-ovatis, sessilibus. *Stipule* lanceolatæ, erectæ.

Flores alterni, axillares, erecti.

Fructus deflexi.

Pedunculi foliis paulo breviores.

Corolla alba.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, patent-erectum: *folio-*
lis oblongis, acutis, concavis, foras pilosis.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, obtusissima, sessilia,
marginibus incumbentia, hemisphærice concava, trunca-
ta apparent.

STAM. *Filamenta* decem, corolla paulo minora; ultima
breviora. *Anthera* subrotundæ.

PIST.