

- STAM. *Filamenta* decem, subulata, receptaculo inserta, parallela. *Anthera* oblongæ.
- PIST. *Germen* superne latius, (sessile), angulatum, obtusum, acuminatum. *Stylus* brevis. *Stigma* simplex, acutum.
- PER. Fructus angulatus, angulo singulo uniloculari, compresso.
- SEM. solitaria; oblonga, dura.

Differunt inter se hæc duæ species in Calyce: foliis tribus inferioribus subrotundis & ovatis; in Corolla: *Unguibus* longioribus & brevioribus. *Lamina* subrotunda, magna vel obversa ovata: *Staminibus* inæqualibus & æqualibus pubescentibus & glabris; *Germine* pentagono & trigono; *Fructu* pentagono & quinquelabiato alis membranaceis & trigono triloculari. Plura in spec. nov. §. 1.

104. MELASTOMA. *Gen. Pl.*

- STAM. squamulæ decem, minimæ, sub filamentis calyci adnatæ.
- PIST. *Germen* subrotundum, calyce involutum (non sub receptaculo floris). *Stylus* filiformis, rectus. *Stigma* obtusum.
- PER. *Bacca* . . coronata margine cylindræo, (in specie quadam Americana) quinquedentato.

105. MALPIGHIA. *Gen. Pl.*

In Malpighia glabra *Spec. Pl.* 425; 1. in calyce sub quinto foliolo l. inferiore glandulæ sæpius defunt, ut in Bannisteria.

106. CRATÆVA. *Gen. Pl.*

- CAL. *Perianthium* monophyllum, semiquadrifidum, persistens, basi planum, crassum: *Laciniis* linearibus, obtusis, crassis, quarum infima paulo longior; superior minor, laterales adhuc minores, sinibus obtusis.
- COR. *Petala* quatuor, calycis divisuris inserta, oblonga, ad idem latus sursum flexa, patentissima; horum duo inferiora dimidio breviora; *Unguibus* filiformibus.
- STAM.