

115. BIGNONIA. *Gen. Pl.*

Ex quinque vel sex speciebus a me in America visis, unicam tantummodo describam, cum illa a reliquis flore fructuque consimilibus valde differat. Est hæc *Bignonia paniculata* *Spec. Pl.* 623. 5.

CAL. &c. conf. Mscr. descr.

116. CRESCENTIA. *Gen. Pl.*

COR. *Tubus* laxus, gibbus, curvus, infra plica transversali obtusa; procumbens: laciniis acutis: superioribus longioribus, revolutis, inciso-laciniatis.

STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, tubi corollæ longitudine, parallelæ (non patentia), sub dorso corollæ. *Anthera* incumbentes, bipartitæ, utriusque acutæ.

PIST. *Germen* sessile (non periolatum sed cinctum margine glanduloso, obtuso, cui Corolla insidet, quæ fructu excrecente baccam levissime pedicellatam efficit, quam non excrefcit cum Germine; sed hoc vix manifestum est), oblongam *stylus* filiformis, staminibus situ & longitudine æqualis. *Stigma* foliaceum, erectum, ovatum, bipartitum: laciniis planis, parallelis.

*Bacca* maxima, cortice duro, pulpa succosa spongiosa.

SEM. subovata &c.

117. BARLERIA. *Gen. Pl.* 604.

Hujus generis species nova mihi visa fuit Planta annua, subprocumbens, brachiata; specis ovatis, tetragonis: bracteis integris. Fructificatio hujus ita se habet.

CAL. *Perianthium* &c. conf. Mscr. descr.

118. SIDA. *Gen. Pl.*

Ad hoc Genus relata *Sida capitata* *Spec. Pl.* 685. 10. Capitulis septemfloris, quæ hic loci (si eadem sit & ne fallat memoria, Planta Hort. Upsalensis, descripta in Actis Ups) sæpius triflora & involucrata est. Duas insuper species novas, *unam* foliis palmatis, rugosis, villosis; *alteram* foliis lineari-lanceolatis, rugosis, villosis inveni. Involucro triphylio, trifloro donatas. Sic tres species involucratæ sunt; an ideo hæ plantæ, inter Malvas & Sidas intermediæ proprium constituere possunt Genus?