

COR. *Gluma* bivalvis, spatioso a calyce remota: *valvula exterior* magna, calycis dimidii longitudine, obtusissima, compressa, dorso versus apicem maxime gibbo, marginibus erectis conniventibus; *interior* linearis, subulato-convoluta, intra rimam exterioris recondita.

PIST. *Germea* lineare, acutum. *Stylus* capillaris, simplex usque ad longitudinem glumæ interioris, reliqua dimidia parte bifidus, extra corollam prominulus, patulus, filiformis. *Stigmata* undique longitudinaliter pilosa, plumosa.

PER. nullum. Corolla inflata, paulo compressa, nitida.

SEM. oblongo-subulatum, acutum, parvum, angustum, nec dimittit.

Color seminis capsulati albescens. Planta viridis colore arundinaceo. An *Apluda Zeugites*?

101. **ADIANTUM** frondibus bipinnatis: pinnis alternis; foliolis rhomboidalibus acutis ferratis. (*Hisp. Calantrello major*) *absque fructificatione*.

102. **JUSTICIA** *putata* spicis terminalibus pluribus; flore rubro.

Caulis frutescens, a $\frac{1}{2}$ - 2. orgyarum altitudine, simplex, inferne nudus, superius foliosus, rectus, teres, cortice tenaci.

Folia opposita, oblonga, quinquuncialia, utrinque acuta, patentia, basi attenuata in petiolum brevem, supra glabra, infra pubescentia, margine obsoleto denticulata, plana.

Spica 4-8, terminales, teretes, confertæ, erectæ, digitales usque palmares, imbricatæ.

Bractea exteriores oppositæ, sub singulo flore singulæ, oblongo-acuminatæ, margine a medio sursum utrinque duobus quatuorve denticulis, erectis, subulatis, notatæ, erectæ uncia dimidiæ longitudine, apice levissime erecto, patulo. *Bractea interiores* laterales, lanceolato-lineares, acutæ, convexæ, calyci adpressæ ejusque longitudine, glabræ, membranaceæ.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, ad basin perfecte divisum: *foliolis* tribus exterioribus lanceolato-acutis, apice setaceis, membranaceis, glabris, horum dorsale vel *bractea* dorsali proximum paulo latius majusque, interiora duo similia, sed paulo breviora, lateralialia omnia apice setaceo, erecta, corollæ adpressa.

COR.