

COR. *Tubus cylindricus*, brætese longitudine, tripartitus.
Labium infer. ovato-acutum, convexum, levissime pubescens. *Lab. sup.* paulo brevius, acutum, convexum (*obs. Florem h. t. non explicatum esse:*)

STAM. *Filamenta* quatuor, basi tubi adnata, subulata, tubo longiora, adscendentia: horum duo minora. *Antherae* oblongæ, spicæ cohærentes; superiores latere interiore cohærent.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* setaceus. *Stigma* simplicissimum, acutum.

Anne ergo Barleria? Flos coccineus est.

103. STÆHELINOIDES foliis ovato-oblongis; pedunculis filiformibus, longis, strictis. 176. 201.

Radix annua, fibrosa.

Caulis erectus, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ pedalis, teretiusculus, glaber, intus subinanic, leviter compresius: Ramis paucis, oppositis, erectis, caulis longitudine.

Folia opposita, ovato-oblonga, subintegerrima, glabra, sesquiuncialia usque ad bi-vel triuncialia, basi in petiolum brevem desinentia.

Flores longe pedunculati, erecti, axillares. **Pedunculus** filiformis, axillaris inter ramum novum & caulem, interdum bini ex ala, uno intra alterum, exteriore longitudine duar. vel trium unciar., recti.

CAL. ex serie extima palearum constat foliolis paucis, oblongis, planiusculis, corollula brevioribus: paleis omnibus in formam ovatam.

COR. universalis composita in formam ovatam, flosculis omnibus herinaphroditis, *Corollula* tubulata, palearum longitudine, ore patente.

STAM. *Anthera* cylindrica, corollula brevior.

PIST. *Germen* sub corollula. *Stylus* corolla brevior.

PER. . . .

SEM. oblonga, pauca, angulata, subquadrata, leviter antrorsum compressa.

Paleæ lineares, erectæ. *Corollæ* viridi-luteæ.

104. GRISLEA secunda.

Caulis frutescens, erectus, 2. 3. orgyar. altitudine: ramis paucis, rectis, superne *Ramis* sparsis, parallelis, longis,