

longis, inferius lateraliter stylum utrinque semiobvolventibus, enatis margine patulo, terminali, subrotundo, late emarginato, undulato; *supra* membranulis longitudinalibus, erectis, inæqualibus, undulatis notatis, *infra* nectario concavo in medio, longitudinali.

STAM. innata apici styli in fovea propria, corpusculo subrotundo, subtus quadriloculari, latere superiore utrinque emittente *Filamentum* quadripartitum, *Antheras* duas in singulo filamento generis (quatuor ex singulo latere).

PIST. *Germen* teres, filiforme, ipso pedunculo continuato nec crassius, sub flore. *Stylus* convexus, inclinatus versus nectarium, infra fovea concava pro staminibus notatus, longitud. 3/4 parte nectarii. *Sigma* fovea est cordata, nitida, depressa.

133. EDECHI (155) *Frutex* arborescens, altus, *ramulis* oppositis, patentissimis. *Foliis* oppositis, oblongis, uncialibus, venis subsimplicibus, planis, subciliatis; *pedicellis* brevibus, *pedunculis* oppositis ex axillis antiquis, uncialibus, ramulis dichotomis, brevissimis; *fructibus* globosis, sub receptaculo; *seminibus* subrotundis, quinque.

XIV. 134. Arbor ramis patulis, floribus luteis; copiose florens, humilis, vel frutex altus, ramis alternis, patentibus, paulo inæqualibus.

*Folia* alterna, oblonga, decidua.

*Flores* plures, terminales, alterni in racemo simplici & composito mixtim; pedunculi alterni, unilori.

CAE. *Pertanthium* pentaphyllum, patens: *foliis* oblongis, concavis, antea imbricatis, coloratis, deciduis, duar. lin. longitudine.

COR. pentapetala: petalis patentibus, obovatis, obtusis, levis-simis, sed late emarginatis, calyce sesquialongioribus.

STAM. *Filamenta* nulla. *Antheræ* oblongo-lineares sursum angustiores, erectæ, longitudine corollæ dimidiatæ, apice duobus foraminibus, obtusæ, alternæ e regione fere calycis, omnes apice paulo inflexæ.