

SEM. longitudinaliter imbricata more Bignonæ, subquadrato-oblonga, utrinque acuta membrana paraflo-gramma.

138. FRUTEX foliis alternis oblongis glabris; altus varie ramosus: ramis longis æqualibus glabris.

Folia copiosa, pendula, acuta, integerrima, nitidiuscula, subcomplicata, subtus pallidiora, biuncialia. *Petoli* breves, longitudine dua. vel trium linea. supra sulco convexo exarata.

Flores in racemis compositis terminalibus, copiosi, alterni pedicellis propriis lineæ circ. longitudine, ramis communibus, angulatis.

CAL. . . .

COR. decidua.

PER. *Capitula* linearis, oblonga, compressa, truncata, basi angustata, apice truncato, submarginata, bilocularis dissepimento transversali.

SEM. solitaria, oblonga, subulata deorsum, sericeo-pubescentia, cincta pappo sericeo, semine longiore, antea dorsum reflexo, postea patulo.

MALPIGHIODES.

Fructus. Bacca sicca, ovalis, duar. linear. longitudine, levissime compressa, versus apicem obsolete angulata, apparenter striata, monosperma.

SEM. unicum, calyce duro, subosseo, interiore cortice carnosio. (uti Cotyled. Amygdali) crasso, includente seminis corculum teretiunculium, sursum versus & cotyledones lineares dorsum spectantes 2 virides.

139. TEPUGUIPE.

Frutex altus, diadelphus, floribus longissime racemosis, purpureis. Foliis pinnatis: pinnis oblongis, acuminatis, glabris, Ramis longis varie flexis ascendentibus & naturalibus, tuberculis oblongis, sparsis, obtusis, convexis. *Folia* post flores, hoc tempore vix ulla vel in ramis solum sterilibus, versus summitates earundem pinnata, alterna; foliolis quatuor parium cum impari, pedicellatis: inferioribus ovatis vel ovato oblongis; superioribus oblongis; omnibus integerrimis, infra pallidioribus, venosis, 1½ uncialibus. *Petiolus* communis spithamalis, compressus, supra sulco obtuso excavatus; parti-