

Flores solitarii, pedunculati, laterales: *pedunculis* foliis oppositis, e caule ipso egredientibus juxta stipulas, e regione folii vel paulo infra, erecto-patentibus, semiuncialibus usque biuncialibus, teretibus, apice geniculatis, ad geniculum supra emittentibus rudimentum ramuli, infra vero pedicellum teres. *Bracteola*, sub pedicello subulato, tenuis, pubescens. *Bracteole*, altæ duæ utrinque ad calycem, lineares, angustæ, calyce dimidio breviores.

CAL. *Perranthium* monophyllum, tubulatum, quadridentatum, bilabiatum: *lab. sup.* longius, laciniis angustioribus reflexo-patentibus.

COR. papilionacea. *Carina* apice connata videtur ex toto & acuta.

PER. *Legumen* oblongum, obtusum, teretiusculum, uncialiale, undique tumidum, dorso obtusissimo, biventricosum, 1 loculare, bivalve

SEM. plurima (26), reniformia, parva.

142. **PARAMINI.** Arbor magna, ramis varie divisis, inæqualibus.

Folia spithamalia, magna, oblonga, 4-5 uncialia usque spithamalia, glabra, venosa: venis alternis, apice obtusis vel acutis. *Petioles* breves, teretes semiunciales.

Flores non vidi.

Fructus subrotundo-ovatus, acuminatus, 1½ unc. longitudine, externe rudis, cortice carnosio. *nucis* intus oblongo subrotunda, leviter compressa, subossca, externe glabra, transversaliter sessilis: *nucleo* intus subrotundo, oblongo, bipartito, carnosio. *Drupa* comeditur, dulcedine ingrata.

143. **BAUHINIA** *Bacaptal vulgo.*

Frutex mediocris, qui nonnunquam in arborem mediocrem excrefcit, *ramis* varie sparsis sed remotis, rectis, levissime flexuosis, fuis.

Folia alterna, biloba, erecta, ovata, triuncialia, 9-nervia, venosa nervis & venis infra prominulis, subscabris: laciniis ovato-acutis, erectis, sinu valde acuto. *Petiolus* teretiusculus, superne leviter sulcato, semiuncialis.

Flores terminales in racemo longo, spicato, *pedunculis* geminis, patentissimis, reflexis, semiuncialibus, teretibus.

CAL.