

*Folia* alterna, sessilia, ternata: *Foliolis* oblongis, sesquiuncialibus, supra pubescentibus, infra paulo pallidioribus, venoso-reticularis, pedicellatis. *Stipulae* lanceolatae, erectae, striatae, sesquilineae longitudine.

*Flores* axillares, spicati, racemosi: *racemis* oblongis, erectis, semiuncialibus, simplicibus; *pedicellis* sesquilineae longitudine. *Bracteolae* ovatae, convexae, glabrae.

CAU. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, quinquefidum: laciniis subulatis, corolla leviter brevioribus, infima reliquis longiore.

COR. *Vexillum* oblongum, apice patulum, basi utrinque inflexum. *Alae* lineares. *Carina* linearis, apice latior, rotundata, inferius tota fere dehiscens, apice ascendente.

STAM. Diadelpa 1 & 9, simplicia. *Antherae* subrotundae.

PIST. *Germen* oblongo-subulatum, hirsutum. *Stylus* capillaris. *Stigma* crassiusculum, simplex.

PEA. *Legumen* calycis longitudine, hirsutum, ovato-acutum, leviter compressum.

SEM. duo, oblonga, apice ultimo recurvo acuto. (Flores lutei).

154. IPOTARAGUAPIN. *Frutex* erectus, humanae altitudinis & ultra: *ramis* longis, erectis, oppositis, patentissimis, strictis; *Cortice* sulco, glabriusculo. *Stipulae* oppositae, interdum ternae, supra singulos ramos, patentae, subulatae, acutae, rectae.

*Folia* sub spinulis enascentia vel terminalia, fasciculato-conferta, opposita, ovato-oblonga, uncialia, venis oppositis alternisque subtus prominulis, simplicibus, *petiolo* brevi lineari. *Stipulae* oppositae, interfoliaceae, ovato-acutae, planae.

*Flores* in *pedunculis* oppositis vel solitariis, axillaribus, 1-2 uncialibus, rectis, apice bifidis, floriferis: *flores* conferti ut videtur, licet hoc tempore illis destituta.

Fructum fert sub receptaculo ut videtur.

*Drupa* parva, oblonga, trium vel quatuor linearum longitudine.

*Nux* oblonga, obsoleto triangularis: angulo uno prominentiore, teretiusculo, utrinque sulco notato; bilocularis, loculis teretibus, uno in media nuce, altero in angulo