

STAM. *Filamenta* decem, connata, adscendentia. *Anthere* . . . . .

PIST. *Germen* oblongum, compressum, pedicellatum. *Stylus* subulatus.

PER. *Legumen* subrotundo oblongum, planum, membranaceum, uniloculare, intus lignosum.

XXVIII. Ifrån floden Aragua fändes hit til St. Bernardino et slags Sarsaparilla eller *Smilax*, som jag ej sett förr; at brukas til Medicine; och var distinet til sina rötter, ifrån det Species, som ordinarit brukas i Apotheken, och äfven i Indierna.

### 169. SMILAX.

*Radices* plurimæ, filiformes, longæ, duriusculæ, foras tetetes, glaberrimæ absque fibrillis iparsis, verum eorum loco *Spinulis* paucis, brevibus, glabris, subpungentibus, cortice tenui. Ab altera *Specie Officinali* differt figura radiceis filiformi, angulata, cortice crassiore, duro, angulato, rugoso, fibrillis lateralibus plurimis.

*Caulis* scandens, fusiformis, teres, glaberrimus, aculeatus: aculeis subulatis, pungentibus, validis, trium quatorve linearum longitudine, inæqualiter sparsis, ad genicula foliorum pluribus: ramis superioribus subtriatis. Caulis inferne subgeniculatus.

*Folia* alterna, lanceolata, vel oblongo-lanceolata, trinervia, vel cum ultimis minoribus quinquenervia, dura, firmia, erectiuscula, 3. 4. 5-uncialia, versus apicem contorta, petiolata, nervo medio subaculeato: aculeis 1, 2, 3, parvis; interdum inermia. *Peziolus* patens, brevis, semiuncialis, basi crassissimus h. e. tuberculo sentim prodiens, latus, margine membranaceo, semiamplexicauli, membrana firma tamen; subtus convexus, angulo carinatus parvo, subinermi vel serratulô, vel glabro vel spinula una alteraque notatus, apice sursum curvus.

## I. MARTII.

170. MUSA stod i frukt, endast några stånd i blomma. Jag fant altid i den så kallade han-blomman fem stammina cum rudimento 6:ti intra Nectarium och likafå i 1:li Hermaphrodito appellato. Differentiam in utroque vix vidi, nisi quod masculi essent angustiores.