

- Truncus* oblongus, subtumens. *Dorsum* planiusculo-convexum, in medio tumidiusculum ut & latere utroque ad dorsum, versus latera linea laterali elevatiore notatum utrinque, & ad latera linea alia magis interrupta, cum verrucis mollibus, linearibus aliquot juxta ventrem parvis, minimis.
- Palmi* tetradactyli, fissi, circumferentia rotundi, digitis introrsum vergentibus, omnibus obtusis, 1 & 3 paulo longioribus, 2 & 4 minoribus, subæqualibus, subtus tuberculis ad carpos & genicula notatis.
- Plantæ* longæ, fissæ, pentadactylæ, obtusæ: digito 1 minore reliquis, usque 4 sensim longioribus: 4 longitudine 3:ti, geniculis subtus tuberculis lævibus notatis.
- Color* dorsii viridis, lateribus cinereo-sordidis maculis fuscis sparfis, paucis, pone in clunibus variegatis colore viridi-cinereo, maculis variegatis fuscis. Genicula pedum subtus albidiuscula. *Abdomen* albidum.
- XVI. 174. EPIDENDRUM acaule, radice bulboso-ovata, floribus fuscis, nectario albo-cærulescente cordato.
- XIX. 175. BIDENS procumbens, foliis inferioribus alternis oblongis undulatis incanis, superioribus oppositis, floribus oppositis sessilibus pallide purpureis 200.
176. STÆHELINOIDES foliis ovatis ferratis incanis, floribus sessilibus. Petala Marrubii facie 201. 103.
177. SPONDIAS optime floret. HOB0 *vulga*.
CAL. quinquedentatus, minimus.
COR. petala reflexa.
Nectaria decem intra stamina.
- STAM. decem.
- PIST. 4 & 5, erecta, longiuscula, approximata.
178. CHRYSOPHYLLO fructu adfinis, foliis pungentibus; vulgo *Barbasco*.
PER. *Bacca* subrotunda, uvæ minoris magnitudine, foras striatula, acuminata; acumine rigido, cortice ipso secedente a pulpa s. femine globofo, in superficie notato rudimentis 3-4 hoc tempore vacuis, mollibus. Substantia pulpæ h. t. mollis, butyracea.