

tibus, obtusis, coloratis: Foliolo superiore paulo latiore reliquis & obtusiore.

COR. *Petala* quinque, erecta, calyce interiore duplo longiora, oblonga, basi media sua parte inferne ungviculata: ungvibus teretibus. *Lamina* oblonga, erecta, obsolete subundulata, supremum intra fissuram vaginæ staminum.

STAM. *Filamenta* undecim (quod constans & curiosum) connata in vaginam ad latus superius, usque ad basin corollæ (& calycis interioris) dehiscentem & divisam; altitudine calycis interioris, connata, demum soluta, subulata, alterna leviter longiora, subcurva. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* teretiufculum, oblongum, inferne pedicellatum; pedicello adnato lateri inferiori tubi calycis interioris, vel si mavis tubo staminum, infra calycem anteriorem, pubescens. *Stylus* filiformis, staminum longitudine. *Stigma* obtusum, simplex, nigrum.

Color Corollæ coccineus & roseo-coccineus.

Fructum non vidi.

183. **ERYTHRINA** foliis ternatis, caule aculeato. *Sp. Plant.* 706: 2. ni fallor; **ANAUCO** vulgo.

Flores racemosi, subsecundi, conferti, 2, 3, 4, ex uno puncto: *racemis* digitalibus, spithamalibus. *Pedunculi* horizontales; trium vel quatuor linearum longitudine, teretes, unilaterales. *Flores* nutantes. *Bracteas* non vidi, nescio itaque an adiant.

CAL. *Perianthium* monophyllum, brevissimum, turbatum: ore integerrimo, obtuso, truncato, inferius producto in appendicem deorsum versum, obtusum, teretiufculum.

COR. papilionacea, irregularis. *Vexillum* oblongo-acuminatum, ascendens, dorso acute carinatum, marginibus leviter reflexis. *Alæ* duæ, brevissimæ, subrotundæ, vix calycis duplæ longitudinis, adpressæ. *Carina* falcata, aperta, apice bifida laciniis ovatis, obtusis, compressa, marginibus superioribus conniventibus, vexillo quinque brevior.

STAM. *Filamenta* decem, diadelpa, superius solutum & novem connata in vaginam usque ad apicem Carinæ,