

Uti s̄jelfva tråsket fant jag :

192. ÆSCHYNOMENE frutescens, foliis pinnatis.
193. PLANTA Beccabungæ similis, in aqua paludosa natans, caulis ex axillis radiculas emittens, cum tuberibus oblongis, spongiosis, albis, copiosis, sessilibus, axillaribus. Flores non vidi.
194. HYDROCOTYLE foliis reniformibus, margine lobato. Umbellulae 3, 4, 5, floribus.
195. SALVINIA Michelii copiose.
Folia punctis obtusis, erectis, quadratis, longioribus undique teguntur. De áro Samets like.
196. PISTIA planta natans, facie Plantaginis, foliis subrotundis, omnibus radicalibus hirsutis, rose in modum patentibus, absque flore.
197. UTRICULARIA radicibus natantibus absque utriculis, nectario conico. Adeo exacte refert Utriculariam Europæ nectario conico, ut dubitarem an distincta esset, Radices tamen s. folia natantia, late in ramulos sparsa, omnino carent utriculis.
Radices repentes, natantes, fibris copiosis, cōfertis, omnino absque vesiculis, An folia potius dicendæ.
Scapi erecti hinc inde, pauci ex axillis. Radic. ramifications digitales & spithamales, simplices.
Flores alterni, sparsi, 6-12. erecti, pedunculati : pedunculi teretes, sub florescentia erecti, postea nutantes, 3-4 linearum longitudine. Bractæ obtusæ, parvæ, glabré, convexæ, basi involventes pedunculum.
CAL. Perianthium diphylum : foliolis oblongis ; equalibus, convexis, basi persistens.
COR. Irregularis, ringens, monopetala. Tabus nullus.
Lab. superius erectum, subrotundum, inferiore dimidio brevius, basi perforatum pro germine. Lab. inferius patens, subrotundum, superiore duplo majus, basi saucis patato prominente, biventricoso, apice leviter emarginato, subtus terminatum in nectario, sub labio flexo.
Nectarium subulatum, longitudine labii inferioris, conicum, paulo depresso, adpresso labio inferiori.