

- Festuca maritima*, subpaniculatum semel tantum legi.
Bromus distachyos.
Avena pratensis. *Guett.* 1. p. 182. n. 4. Sed spiculæ non cylindricæ. Folia apice carinata, dura, acuta, mucronata.
Gnaphalium capitatum.
Elymus Caput medusæ. Flosculis adpressis longissime aristatis, involucris setaceis patentissimis.
 Scabiosa parva annua semine stellato.
Crucianella patula, ramis & foliis patentissimis. Flores nondum vidl.
Galium parisiense tenuissimum, semine pubescente.
Plantago subulata.
Plantago Psyllium minus C. B.
Cynops majus.
Aphanes arvensis: minor in campis apricis; major in apricis collibus.
Plantago albicans, scapus foliis duplo longior est.
Hypocoum procumbens.
Hypocoum pendulum.
Bufonia tenuifolia, stamina 4 observavi, petalis minutis, (revocavit postea stamina).
Myosotis scorpioides palustris.
Lithospermum fruticosum.
Anchusa undulata, pilosa foliis linearibus denticulatis, pedicellis bractea minoribus. Calyces sub fructificatione inflati, in pratis.
Myosotis apula floribus omnino luteis a M. scorpioides differt: corollæ tubo longiore, staminibus altius corollæ parietibus affixis.
Cynoglossum cheirifolium foliis lanceolatis incanis, corollis calyce majoribus; in campis.
Lycopsis arvensis in pratis arenosis.
Echium vulgare ni fallor.
Anagallis arvensis cærulea. C. B. copiose ad margines agrorum.
Convolvulus Cantabrica. *Convolvulus Linariæ* folio. C. B. ad colles.
Campanula Rapunculus in lateribus collium subgraminosis.
Chenopodium Botrys in campis arenosis.
Bupleurum minimum?