

- Cistus suffruticosus*, fol. lanceolatis venosis stipulaceis, pedunculis bractea simplici lateralibus, ex Horto Qveriano.
- Cistus ledifolius* herbaceus procumbens, foliis oblongis rugosis stipulaceis, pedunculis alternis bractea simplici oppositis.
- Cistus salicifolius* herbaceus erectus, fol. oblongo-lanceolatis, stipulaceis, floribus alternis sessilibus bractea triplici oppositis.
- Cistus guttatus* erectus herbaceus, foliis oppositis trinerviis lanceolatis, pedunculis alternis nudis, in pratis graminosis.
- Cistus Fumana* lignosus est & tortuosus procumbens, foliis acerosis sparsis, floribus subsolitariis.
- Cistus annuus*, vix specie distinctus a *C. guttato*, facie licet divertus, forte ex loco natali ficciori, in campis & collibus apricis.
- Reseda Ehyreuma*, communiter strigosa est.
- Reseda glauca*, 4-gyna, fol. linearibus basi fetaceo-denticulatis. Sesamoïdes fructu stellato. *Tournef. inst. 424* ad margines collium agrorumque.
- Reseda purpurascens*, 5-gyna, foliis linearibus integerrimis, fructu corniculis quinque obtusis. Sesamoïdes flore albo, foliis canescentibus. *Tournef. inst. 424.* in collibus campestribus.
- Reseda Luteola*, folio crispo.
- Thalictrum flavum speciosissimum*. *Thalictrum majus flavum* staminibus luteis s. glauco folio. *Bauh. pin. 336.* *Tournef. inst. 230.*
- Ranunculus parviflorus*, flore parvo nemorensis.
- Ranunculus arvensis*, foliis superioribus linearibus, ubique in agris ficcis.
- Ranunculus muricatus*, foliis omnibus radicalium simillimis, in aquis.
- Ranunculus falcatus*. Calycis basis in nostrate simplex est.
- Teucrium Polium* tomentosum procumbens. *Polium montanum* album. *C. B.*
- Teucrium capitatum* incanum erectum.
- Glechoma arvensis*, ut puto.
- Sideritis* calycibus tomentosis acutis, foliis linearibus, ex Horto Qveriano.
- Phlomis Lychnitis Clusii*.