

- Trifolium resupinatum*. Capitula florum turbinata, glabra. Corolla convolvitur semper, ut carinæ exacte versus centrum vergant, ut ut vexillum versus peripheriam. Calyx fructiger dorso gibbi elongatus, inflatus. In priori (T. tomentoso) corolla semiconvolvitur, adeo ut carina oblique centrum spectat, calyce semper albo, hirsuto.
- Anthyllis lotoides* caule procumbente, leguminibus parallelis erectis subarcuatis, calycis magnitudine.
- Anthyllis cornicina* caule procumbente, leguminibus ovatis obtusis deflexis.
- Lotus hirsuta*, flore albo. Ex Horto Pharmacopœorum.
- Lotus Dorycnium*.
- Hyoseris Rhagadioloides* ? vulgatissima Madriti in plateis.
- Lapsana stellata*.
- Scorzonera resedifolia*. Caulis procumbens ascendens. Folia caulina rara, lata, dentato sinuata.
- Scorzonera angustifolia* caule erecto, fol. subulatis strictis.
- Cnicus benedictus*, sponte in versuris agrorum.
- Atractylis cancellata*. Receptaculum tectum est paleis coalitis.
- Xeranthemum annuum* capitulis inapertis. *Hall. herb. 709.*
 1. sed vix nisi varietas hortensis.
- Filago montana* floribus obtusis.
- Cotula aurea*.
- Chrysanthemum pallidum* minus, imisque foliis incisiss, superioribus integris & capillaribus. *Barrel. ic. 421.* (imperfectum exemplar.)
- Filago pygmaea*.
- Viola tricolor*, flore toto albo, in campis sub spartis.
- Aristolochia Piftolochia*, in subdepressis.
- Carex vulpina*, in collibus & marginibus agrorum.
- Carex arenaria*, in arena juxta fluviorum margines.
- Carex leporina* ex Retiro.
- Poterium Sanguisorba*.
- Quercus*, Ilex foliis rotundiore modiceque sinuato. *C. B.*
- Salix purpurea*.
- Ægilops ovata*.
- Olyris alba*.
- Chara vulgaris* setis introrsum pinnatis.
- Chara flexilis* setis teretibus nudis. Fœtet plus antecedente.
- Agrostis cœnitis* inflexis, panicula spicata tereti.