

distincti, hinc, habitus fere Commelinæ, cui adfine genus est, nectario omnino caret. Corollæ color aequalis, membranaceus.

Habitat in uidis depressis, sub fruticibus ubique circa Barcellonam novam.

PENTANDRIA.

MENAIIS.

CAL. *Perianth.* triphyllum, laxum: foliolis linear-acutis, striatis, concavis, erecto-patulis, persistentibus.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindricus, calyce longior. *Limbus* patens, 5-partitus, lacinis oblongis.

STAM. *Filamenta* nulla. *Antheræ* 5, lineares, acutæ, sessiles, adnatæ summæ tubi fauci e regione incifurarum limbi.

PIST. *Germen* subrotundum, depresso. *Stylus* filiformis, erectus, tubi altitudine. *Stigmata* duo, subconnivencia, oblonga, acuta.

PER. *Bacca*.

EDECHIA ad Curataquiche.

CAL. *Perianth.* monophyllum, tubulatum, teres, ore integrum, persistens.

COR. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* calyce multo longior, cylindricus. *Limbus* 5-partitus: laciñis oblongis, patentissimis.

STAM. *Filamenta* 5, brevissima, supra medium tubi adnata, capillaria. *Antheræ* lineares, tubi altitudine.

PIST. *Germen* subrotundum, receptaculis cinctum. *Stylus* filiformis, staminibus altior. *Stigma* capitatum, subrotundum.

PER. *Drupa* subrotunda, parva.

SEM. *Nux* subrotunda, ossea, 4-5 locularis (in altera specie 2-loc. irregularis) nucleis teretibus.

1. sp. inermis. p. 271.

2. sp. spinosa. p. 259.

CELOSIOIDES.

CAL. *Perianth.* pentaphyllum, patens: foliolis lanceolatis, concavis, siccis, persistentibus.

COR.