

## HEPTANDRIA.

## PISONIA

**CAL.** *Perianth* monophyllum, subulatum, superne latius, 5-angulare, obsolete 5-dentatum, minimum.

**COR.** nulla.

**STAM.** *Filamenta* septem, subulata, erecta, basi fere connata, receptaculo inserta. *Antheræ* subrotundæ, didymæ, calycis dimidii altitudine.

**PIST.** *Germen* oblongum, utrinque contractum, in fundo calycis. *Sylus* filiformis, calyce altior, ad latus inferius inclinatus, apice sursum curvo s. ascendente, *Stigma* multifidum, lacerum, penicilliforme.

**PER.** . . .

**SEM.** . . .

A *Pisonia* differt staminibus brevibus; stigmate & sexu hermaphrodito.

## OCTANDRIA.

## COMBRETUM.

Frutex fol. oppositis, fr. 4-gono, membranaceo, monospermo. *Ado* vulgo.

**CAL.** *Perianth* monophyllum, germiini insidens, campanulatum, quadridentatum, denticulis brevibus, lato-acutis; deciduum.

**COR.** *Petala* quatuor, parva, ovato-acuta, ex incisuris calycis, vix dentibus longiora.

**STAM.** *Filamenta* octo, longissima, setacea, erecta. *Antheræ* suboblongæ, parvæ.

**PIST.** *Germen* sub receptaculo, lineare, quadrangulare, angulis compressis, superne acuminatum. *Sylus* setaceus, longitudine staminum, ad basin hirsutus. *Stigma* simplex, acutum.

**PER.** nullum nisi crustam feminis tetragonam velis.

**SEM.** apicium, oblongum, nudum, tetragonum; angulis longitudinalibus membranaceis magis, apice acuminatum; medio oblongo 4-gono, angulis compressis, Cotyledonibus corrugatis, corculo ex apice.

Hinc flos fere *Griseæ*, sed germen sub receptaculo. Stamina erecta, & fructus abunde distinguunt.

DE-