

Flores in racemo opposito infimo folio, composito ramulis alternis, ex quorum summitate 3 l. 4 flores prodeunt, pedicellati.

Braçtææ singulo ramulo laterali binæ oppositæ.

Braçtææ ad pedicellos 4. v. 3. majores, patentes, ovatæ.

Pedicelli $\frac{1}{2}$ unciales.

CAL. *Perianth.* 5-phyllum, erectum, patens, rigidum, strictum; foliolis lineari-acutis marginibus crassis, ante florem apertum contiguis, $\frac{1}{2}$ uncial. foras pubescentipilosis, deciduis.

COR. *Petala* 5, erecta, oblonge subrotunda, calycis medio leviter altiora, breviter unguiculata, ungue oblongo, sursum mox latiore, obtusiusculo.

STAM. *Filamenta* plurima 100-200. filiformia, corolla $\frac{1}{2}$ breviora, compacta, superius planiuscula, extima sterilia, superne foliacea, lanceolata, subhirsuta. *Anthera* oblongo-lineares, latere interiore filamento adnatæ, apice subfoliaceo, subhirsutæ.

PIS. *Germen* subrotundum, depressum. *Stylus* filiformis, flaminibus duplo longior, corolla paulo longior, apice leviter curvus. *Stigma* obtusum, perforatum, cylindri instar.

PER. *Bacca* subrotundo-orbiculata, depressa, palmæ latitudine, undique echinata: echinis mollibus, nec adeo asperis, acutis, pilosis, interius carnosa, forte Capsula.

SEM. plurima, subrotunda, paullo compressa, mediocria.

Color Corollæ luteus.

EPILOBII vel **RHEXIÆ** adfinis.

Radix tuberosa, coagmentata, radiculis fibrosis.

Caulis erectus, herbaceus, simplex, 3-5 pedalis, hirsutus, teres.

Folia opposita, ovato-oblonga, 3 vel 7-nervia, hirsuta, sessilia.

Flores axillares 1. 2. 3, brevi ramulo elevati.

CAL. *Perianth.* 1 phyll. tubulato-campaulatum, 5-fidum: laciniis lanceolatis, erecto-patulis, foras hirsutis.

COR. *Petala* 5, subrotunda, inserta Calyci, laciniis ejus triplo majora, obtusa.

STAM.